



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID

## INFORME DE NECROPSIA

Nº: 10/0084

FECHA 23/03/2010

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO COMPLUTENSE

REMITIDO POR: ALBA (chip 94500000917696) | TLFNO/FAX: 660297838

DIRECCION: Apdo. de Correos 59117 28080-MADRID

ESPECIE: CANINA | RAZA: MESTIZO-CANICHE | NOMBRE: CAROL

EDAD: 1.5 AÑOS | SEXO: HEMBRA | Nº HISTORIAL :

### ESTUDIO MACROSCOPICO:

INSPECCION EXTERNA: mucosas explorables normales. Cicatriz de incisión quirúrgica de 1cm. en línea alba.

INSPECCION INTERNA:

Hígado y bazo: aumentados de tamaño y de coloración roja intensa; al corte fluye gran cantidad de sangre. Páncreas, adrenales, riñones y vejiga de la orina: sin alteraciones macroscópicas reseñables. Genital: muñón quirúrgico de ovariectomía en proceso de cicatrización normal. Aparato digestivo: estómago e intestino sin alteraciones relevantes.

Ganglios mesentéricos: normales.

Tráquea y pulmones: abundante contenido espumoso de color rosado en vías aéreas.

Pulmones con coloración y consistencia aumentada de forma difusa, y al corte fluye abundante contenido espumoso.

Corazón: presencia de aproximadamente 10 cc. de líquido rojizo en saco pericárdico; marcada dilatación de la cavidad del ventrículo derecho; engrosamiento regular de la válvula tricúspide.

Ganglios mediastínicos: normales.

Sistema nervioso central: discreta congestión de los vasos meníngeos.

### ESTUDIO HISTOPATOLOGICO:

Aunque por la congelación / descongelación, las muestras se encuentran parcialmente autolíticas, destaca:

Bazo e hígado: severa congestión pasiva aguda. Pulmones: severa congestión y edema de pulmón agudo. Corazón: endocardiosis ligera de la válvula tricúspide. Resto de órganos: sin cambios histológicos reseñables.

### DIAGNOSTICO FINAL:

LESIONES RELEVANTES: - Hidropericardio; - Cardiopatía dilatada de ventrículo derecho; Endocardiosis de la válvula tricúspide; - Congestión y edema de pulmón agudo; - Congestión pasiva aguda hepática y esplénica.

DIAGNOSTICO FINAL: Insuficiencia cardiaca congestiva aguda.

### COMENTARIO:

Las lesiones observadas son compatibles con una Insuficiencia cardiaca congestiva originada por un fallo cardiaco derecho secundario a una hipertrofia dilatada del ventrículo derecho por endocardiosis de la válvula tricúspide.



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO  
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA